



BILANTUL REHIDRA

Pienso complementario dietético



**Rehidratar
es lo más
rentable**

¿Qué hace?

- Recupera animales con deshidratación.
- Recupera animales con procesos diarreicos.
- Recupera animales después del transporte.
- Recupera animales con deshidratación por estrés calorico y estrés por destete.

¿Qué conseguimos?

- Evitar muertes por deshidratación.
- Restablecer la salud del animal deshidratado.
- Evitar el uso indiscriminado de antibióticos en procesos diarreicos.
- Mayor beneficio económico (retorno 100:600).

¿Cómo se utiliza?

- Disolver 3 kg de BILANTUL REHIDRA por cada 100 litros de agua. (1 kg/33 litros de agua) (30 g/1 litro de agua).
- En animales jóvenes se recomienda administrar el rehidratante en agua templada (30° C).

¿Dosis?

- La administración de Rehidratante depende del porcentaje de deshidratación del animal.
- Los litros a administrar del rehidratante es igual al peso inicial del animal sano menos el peso del animal deshidratado.
- Dosis mínima 5% del peso vivo del animal.





BILANTUL REHIDRA

Pienso complementario dietético

BILANTUL REHIDRA

Pienso complementario dietético en forma de polvo soluble que actúa como rehidratante isotónico.

USOS RECOMENDADOS:

Estabilización del equilibrio hídrico y electrolítico en animales deshidratados.

Prevención y tratamiento de trastornos intestinales (diarrea) y su convalecencia.

COMPOSICIÓN:

Dextrosa; Cloruro sódico; Cloruro Potásico; Bicarbonato sódico; Citrato Potásico.

MODO DE EMPLEO:

Añadir 30 g de BILANTUL REHIDRA sobre 1 litro de agua potable (o bien 300 g sobre 10 L agua ó 3 kg sobre 100 L agua).

TERNEROS MAMONES: Con un 5% de deshidratación 2 tomas de 1.5 litros. En casos de diarreas dar el suero rehidratante fuera de las horas que se suministra la leche maternizada.

TERNEROS PASTEROS: Con un 7% de deshidratación dar entre 15/20 litros por animal.

CORDEROS Y CABRITOS: De 0.15 a 0.20 L por toma. Hasta que desaparecen los síntomas diarreicos.

LECHONES: < De 10 Kg de peso vivo. 0.2 L por toma hasta que desaparezcan los síntomas de diarrea.

POTRILLOS: 1 a 1.5 L por toma. Hasta que desaparecen los síntomas de diarrea. Cuando se administra suero rehidratante, no mezclarlo con la leche maternizada ni dar agua de bebida hasta dos horas después de la administración.

VACAS LECHERAS: Dar 40 litros por vaca después del parto.

CERDAS REPRODUCTORAS: 10 litros por cerda después del parto.

PERÍODO DE USO: De 1 a 3 días, si constituye el alimento exclusivo.

ALMACENAMIENTO:

Almacenar en lugar fresco y seco, alejado de las fuentes de calor. Mantener el envase cerrado.

PRESENTACIÓN:

Caja de 8 x 1 kg

Saco de 20 kg



Innovación en salud y bienestar animal

