



Con goma de algarroba



Farmalac[®]

Pienso complementario dietético



Indicado en diarreas neonatales

- ✓ Estabilización del equilibrio hídrico y electrolítico para apoyar la digestión fisiológica.
- ✓ Producto en polvo a base de pectinas y nutrientes destinado al tratamiento complementario de las diarreas de los terneros

Formula equilibrada

- ✓ Con leche descremada que facilita la digestión
- ✓ Contiene goma de algarroba, que ayuda a la formación de gel en el intestino del animal, reduciendo el tránsito intestinal y mejorando la digestión.
- ✓ Muy apetecible por su contenido en leche.

Con aportación de vitaminas

- ✓ Contiene vitamina A, B1, B2, B6, B12, C, D, D3, E, K






La doble acción de Farmalac

Goma de algarroba:

Ejerce su acción como protección mecánica de las vellosidades intestinales impidiendo que las bacterias patógenas se adhieran a ellas.


Bacterias patógenas



Extracto de *Saccharomyces cerevisiae*:

Actúa como prebiótico promoviendo el crecimiento de la flora intestinal que compite con las bacterias patógenas en la afinidad por los enterocitos.

Bacterias patógenas



COMPOSICIÓN

Dextrosa de leche descremada y suero de leche, pectina, bicarbonato sódico, extracto de la pared celular de *Saccharomyces cerevisiae*, cloruro magnésico, cloruro potásico y cloruro cálcico.

Aditivos por kg:

Conservantes:

Diacetato de sodio (E 262) 6 g

Emulsionantes:

Goma de garrofín (Goma de Algarroba) (E-410) 50 g

Vitaminas:

Vitamina A (3a672a) 1.100.000 IU

Vitamina D3 (3a671) 200.000 IU

Vitamina E (3a700) 101 mg

Vitamina B1 (3a821) 58 mg

Vitamina B2 / Riboflavina 104 mg

Vitamina B6 / Clorhidrato de piridoxina (3a831) 37,5 mg

Vitamina B12 / Cianocobalamina 525 mcg

Vitamina C (3a300) 1,15 g

Vitamina K3 (3a710) 46,3 mg

Niacinamida (3a710) 100,5 mg

D-Pantotenato cálcico (3a841) 113,04 mg

INDICACIONES

Prevención y tratamiento de trastornos digestivos (diarrea) y en su convalecencia.

INSTRUCCIONES DE USO

En el agua de bebida, o leche.

Disolver en el agua o leche templada (37° C)

Terneros: 50-100 g/1,5 L leche o agua.

Corderos y Cabritos: 20g/300 ml leche o agua.

Período de utilización recomendado de 1 a 7 días.

Administrar como máximo hasta las 16 semanas de vida del animal.

Se recomienda consultar a un veterinario antes de utilizarlo o de prolongar su período de utilización.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener protegido de la luz a temperatura inferior a 25°C.

PRESENTACIÓN

Bolsa de 1 kg.

αESP-08100341

¹(Department of Dairy and Animal Science. The Pennsylvania State University 324 Henning Building University Park, PA 16802 www.das.psu.edu/dairy/)