



Phosphor-Bovisal®

Pienso complementario liquido para vacas

Complementa la terapia de infusión de calcio

Instrucciones de uso:

Verter un frasco de **Phosphor-Bovisal®** directamente a la boca siguiendo a la administración de una infusión de calcio.

Si la vaca permanece todavía recostada después de 8 - 10 horas (un caso excepcional), debería administrarse otro frasco de **Phosphor-Bovisal®**. (Si es necesario, después de una segunda infusión de calcio.)

Composición:

Fosfato dicálcico, Fosfato monocálcico, Fosfato dimagnésico, Fosfato disódico.

Componentes analíticos:

Proteína bruta 0,0 %, Materia grasa bruta 0,0 %,
Fibra bruta 0,0 %, Ceniza bruta 30,0 %, Calcio 8,3 %,
Fósforo 7,7 %, Magnesio 0,8 %, Sodio 0,15 %,
Agua 65,1 %.

Presentación: 12 x 660 g

Durabilidad: 24 meses



CL 159.04 A
Enero 2015

Phosphor-Bovisal®

Complementa la terapia de infusión de calcio



Phosphor-Bovisal®


Complementa la terapia de infusión de calcio

Los síntomas de la clásica fiebre de la leche y la respuesta terapéutica han cambiado. Más del 70% de las vacas en decúbito muestran una deficiencia de fósforo. La mitad de las vacas en decúbito muestran niveles de calcio y fósforo anormales.

Casos clínicamente manifiestos de paresis parturiente

Porcentaje de vacas con una situación de déficit de calcio/fósforo identificados

Déficit de calcio = $Ca < 1,7 \text{ mmol/L}$; déficit de Fósforo = $P < 1,5 \text{ mmol/L}$



Phosphor-Bovisal®

Con su alto contenido de fósforo (51 g), calcio (55 g) y magnesio (5 g)

- Reduce la duración del decúbito
- Aumenta el porcentaje de éxito terapéutico de la primera infusión de calcio hasta el 90%
- Altamente biodisponible
- Muy apetitoso

Phosphor-Bovisal® chevita GmbH
Complementa la terapia de infusión de calcio