Biocolost® B

Suplemento nutricional líquido para terneros y corderos

Instrucciones de uso:
Ternero: 1 frasco (100 ml)
Cordero: 10 ml (pipeta dosificadora disponible)
para ser administrado por vía oral, inmediatamente al nacer, y como muy tarde dentro de las 6 primeras horas de vida.

Al menor síntoma de diarrea, dividir la aplicación en 2 tomas.

Materias primas:
Suero de calostro, Lactosa

Componentes analíticos:
Proteína bruta 13,0 %; Ceniza bruta 1,5 %; Materia grasa bruta 0,5 %; Fibra bruta 0,0 %; Agua 85 %.

Presentación:
100 ml

CL 139.06 B
Julio 2012

chevita GmbH
D-85266 Pfaffenhofen · Germany · www.chevita.com
Telefon +49-8441-853-0 · Telefax +49-8441-853-51

Distribuidor en España:
COMERCIAL MARTINELL , S.L.
08401 GRANOLLERS
Tel/fax (93) 846 74 43

Biocolost® B

Vida para terneros y corderos

Biocolost® B

Vida para terneros y corderos

Los neonatos no poseen anticuerpos, y solo los producen encantidades suficientes alrededor de las 2-4 semanas de vida. En consecuencia, estos dependen durante la fase crítica de sus vidas, de los anticuerpos maternos, los cuales, solo les pueden ser administrados vía calostro, durante las primeras horas de vida. Por varias razones, el calostro que los terneros/corderos reciben directamente al nacer, es bastante a menudo de calidad y cantidad inadecuada. En tales casos, incluso la inmunidad materna no tiene el efecto deseado.

Biocolost® B
incrementa la inmunidad.

Con un elevado contenido de inmunoglobulinas (12.000 mg) y anticuerpos maternales, derivados del calostro, es particularmente apropiado para corregir la inmunodeficiencia.

Biocolost® B

- complementa el calostro inadecuado
- corrige la inmunodeficiencia al nacer y en animales con diarrea
- su uso es a menudo necesario
- sin receta

Biocolost® B
se obtiene del calostro de rebaños seleccionados y controlados

Biocolost® B

- Aplicación cómoda e higiénica a través de su nueva presentación y tapa protectora
- Frasco listo para utilizar:
  100 ml por ternero
  10 ml por cordero
- Almacenaje sin refrigeración (entre 4° C y 20° C)