

TABERGAT LECHE EN POLVO

Alimento completo de lactancia para gatos

Sustituto de leche materna para gatitos y
complemento nutricional para hembras en lactación.

COMPOSICIÓN:

Leche parcialmente deslactosada y productos lácteos:

Vitamina A	62500	UI	
Vitamina D ₃	2000	UI	
Vitamina E (α-tocoferol)	35	mg	
Vitamina B ₁	75	mg	
Vitamina B ₂	50	mg	
Vitamina B ₁₂	75	µg	
Ácido nicotínico	150	mg	
Ácido pantoténico	150	mg	
Ácido fólico	12,5	mg	
Cloruro de colina	1250	mg	
Vitamina C	1250	mg	
Hierro (sulfato ferroso, monohidratado)			29 mg
Iodo (ioduro de potasio)			7 mg
Cobalto (carbonato básico cobaltoso, monohidratado)			2 mg
Manganeso (sulfato manganeso, monohidratado)			25 mg
Zinc (sulfato de zinc, monohidratado)			3 mg
Excipiente c.s.p.			1 kg

COMPOSICIÓN ANALÍTICA:

Proteína Bruta 32 %; Materia Grasa Bruta 18 %; Celulosa Bruta 0,6 %; Cenizas Brutas 7 %; Calcio 1 %; Fósforo 0,8 %; Sodio 0,29 %, 401 kcal/100g.

PROPIEDADES:

TABERGAT LECHE EN POLVO MATERNIZADA para gatitos es un sustituto de leche materna, formulado a base de proteínas de alto valor biológico, aminoácidos esenciales, ácidos grasos, hidratos de carbono de fácil asimilación, vitaminas, minerales y oligoelementos.

Sustituye a la leche materna ya que incorpora de manera equilibrada todos los nutrientes que la lactancia natural aporta.

INDICACIONES:

Lactación de gatitos huérfanos o rechazados por la madre, ayuda a la lactancia en camadas numerosas, insuficiente producción de leche o mala calidad de ésta, suplemento alimenticio para hembras en gestación o lactación, fortalecimiento de animales de edad avanzada o enfermos.

ESPECIES DE DESTINO: Gatos



DOSIS Y MODO DE EMPLEO:

Previamente disolver la leche en agua tibia (40° C) en la proporción de 1 cucharadita rasa de concentrado de leche (aproximadamente 3 g) en 3 medidas de agua tibia (15 ml). Agitar vigorosamente para que no queden grumos.

Preparar la leche en cada comida.

El número de tomas al día y la cantidad de leche por toma varía en función de la edad y el tamaño del cachorro. A título orientativo se propone la siguiente tabla de dosificación:

*** Desde el nacimiento a la 2ª semana de vida:**

RAZA	Nº medidas rasas de leche	Volumen de agua	Nº tomas recomendadas
Razas pequeñas	1 medida (3 g)	15 ml (3 medidas)	10
Razas medianas y grandes	2 medidas (6 g)	30 ml (6 medidas)	10

*** 3ª y 4ª semana de vida:**

RAZA	Nº medidas rasas de leche	Volumen de agua	Nº tomas recomendadas
Razas pequeñas	3 medidas (9 g)	45 ml (9 medidas)	8
Razas medianas y grandes	4 medidas (12 g)	60 ml (12 medidas)	8

*** A partir de la 4ª semana de vida:**

Complementar el suministro de leche a libre voluntad, conjuntamente con la introducción de la alimentación sólida.

Una cucharadita rasa equivale aproximadamente a 3 gramos de leche.

Presentación Comercial: Envases de 250 g.