



## BAYFEED

### Pienso complementario dietético para animales jóvenes.

**Objetivo de nutrición específico:** Estabilización del equilibrio hídrico y electrolítico.

**Características nutritivas esenciales:** Predominantemente electrolitos e hidratos de carbono fácilmente asimilables.

### Análisis:

Fuente de Hidrato de carbono (Dextrosa 40%)

Cenizas brutas: máx. 19%

Sodio: 4,70%

Potasio: 1,40%

Cloruros: 4,10%

Magnesio: 0,30%

Azúcares totales (Glucosa): 35%

No aporta calcio, fósforo, proteína bruta, materias grasas brutas ni celulosa bruta.

### Composición:

Cáscara de Plantago ovata (Dialina): 40%

Dextrosa. 40%

Bicarbonato de sodio: 8%

Cloruro sódico: 5%

Citrato sódico: 3%

Cloruro potásico: 3%

Hidróxido magnésico: 1%

### Usos:

BAYFEED es un gel con alto contenido en electrolitos, hidratos de carbono y Dialina, un mucopolisacárido de origen natural no digestible. Se utiliza en animales jóvenes (terneros, corderos, cabritos y potrillos) para la prevención y durante el tratamiento de los trastornos diarreicos pudiendo llegar a utilizarse como lacto-reemplazante durante la convalecencia.

BAYFEED regula el tránsito intestinal y asegura una alimentación hídrica y energética durante períodos breves (36-48 horas).

### Periodo de utilización recomendado:

Desde 1 a 7 días. Si constituye el alimento exclusivo, de 1 a 3 días.


### Modo de empleo:

*Terneros / potros:* En lugar de la leche.

El primer día: Mañana y tarde: 1 sobre en 1,5 litros de agua templada (40°C)

El segundo día: Mañana: 1 sobre en 1,5 litros de agua templada (40°C)

Tarde: ½ sobre en 0,75 litro de agua templada (40°C) + 0,75 litro de leche.



### *Corderos /cabritos:*

Disolver en 1 litro de agua templada medio sobre de BAYFEED. Administrar tres tomas de 200 ml de este preparado cada 12 horas. Finalmente se administra una cuarta toma de una preparación a base de ½ litro de agua, ½ litro de leche y 15 g (1/4 de sobre) de BAYFEED.



Bayfeed®

VS03-Ene.11

---

Se recomienda consultar a un especialista, o en su caso un veterinario, antes de su utilización.  
Lote nº y utilizar preferentemente antes de:

Nº 18146-CAT

**Contenido neto: 60 g**

Fabricado por:  
VIRBAC S.A.  
8-10, Rue des Aulnaies  
95420 MAGNY-EN-VEXIN  
Francia  
**Nº FR α 95.355.23**

Distribuido por:  
Bayer Hispania, S.L.  
Av. Baix Llobregat, 3-5  
08970 – Sant Joan Despí (Barcelona)  
Nº: ESP08600130