



CADA BOLO CONTIENE

Cobalto 0,5 %
Selenio 0,15 %
Cobre 13,4 %
Yodo 1 %


Instrucciones para un uso correcto en bóvidos

- Utilizar en animales destetados
- Si pesa menos de 250 kg: aplicar  **1 bolo**
- Si pesa más de 250 kg: aplicar  **2 bolos**
- El aplicador permite administrar 2 bolos simultáneamente.
- **Antes de la aplicación** calentar el bolo hasta temperatura corporal



Protocolo de aplicación en vacas adultas y novillas

Aplicación

Repetir 60 días antes del parto  **180**

 **180 días de liberación**

- El bolo es activo durante un mínimo de 6 meses
- Debido a su larga acción, el momento de aplicación se puede adaptar al manejo del rebaño:
 - ✓ **Antes o durante la inseminación**, para mejorar fertilidad.
 - ✓ **Después de la inseminación**, como ayuda a la gestación, aporte de minerales al feto e incluso aporte de minerales a la cría a través de la leche.



La salud animal en manos del Veterinario

Fatro SpA.
Vía Emilia, 285
40064 • Ozzano Emilia • Bolonia • ITALIA

Fatro Ibérica
vet@fatroiiberica.es
www.fatroiiberica.es

