

CATEGORIA: Pienso complementario

COMPOSICION:

Ingredientes por litro:		Aditivos añadidos por litro:	
Sorbitol.....	240 g	Sqbdsv. (*)	
Cloruro magnésico 6H ₂ O.....	210 g	Carnitina clorhidrato (3a).....	50 g
Propilenglicol.....	50 g	Oligoelementos:	
		Cloruro férrico .6H ₂ O (E ₁).....	2.4 g
		Aromatizantes:	
		Extracto de alcachofa.....	1 g
		Extracto de romero.....	1 g
		Extracto de tomillo.....	1 g
		Conservantes:	
		Ácido láctico (E270).....	0.5g
		Ácido sórbico (E200).....	1 g

(*): Sustancias químicamente bien definidas de efecto similar a las vitaminas.

COMPOSICION ANALITICA (%): Azúcares totales (como sorbitol) 24%; Cenizas brutas <0.5%; Humedad 52%; Magnesio 2.5%; Hierro 0.05%; ausencia de Proteína bruta, Fibra bruta, Aceites y grasas brutas, Calcio, Fósforo, Sodio, Lisina y Metionina.

PROPIEDADES: ACTYBOL Lamons es un producto que proporciona ingredientes bioactivos capaces de potenciar el efecto metabólico en los animales, incrementando las defensas y la resistencia al estrés.

ESPECIES DE DESTINO: Todas las especies domésticas.

USOS:

- En situaciones de estrés (ruido, cambios bruscos de temperatura,...) y de forma previa al transporte.
- Cuando se presenta alta densidad de animales, a fin de evitar la agresividad de los mismos y sus consecuencias (mordeduras, picaje).
- Durante la puesta en aves de alta producción.
- Tras el parto de los animales rumiantes.
- Durante la lactancia en animales con camadas numerosas.
- Y particularmente, ante el riesgo de sufrir infecciones bacterianas o víricas que cursen con inapetencia, fatiga, dolor, taquicardias, arritmias o dificultad respiratoria.

DOSIS: Mezclar a razón de 1 ml/litro de agua bebida, durante 1 a 7 días.

Observación: La dosis recomendada puede reducirse, para el mantenimiento de los animales durante, todo el periodo de riesgo, a 0,5 ml/litro de agua de bebida (equivalente a 0,5 ml/10 Kg de p.v.), o incrementarse a 2 ml/litro de agua de bebida (equivalente a 2 ml/10 Kg de p.v.) en casos críticos. Consecuentemente, bajo supervisión del nutricionista o del veterinario, la dosis y el tiempo de administración podrá ajustarse a las necesidades del animal.

SOBREDOSIS, CONTRAINDICACIONES Y EFECTOS SECUNDARIOS: No se han descrito.

ADMINISTRACION DURANTE LA GESTACION Y LA LACTANCIA: No se han descrito contraindicaciones durante estos periodos.

INTERACCION CON OTROS PRODUCTOS: Puede interactuar con productos de naturaleza alcalina, por lo que se recomienda hacer una pequeña prueba de forma previa a ser mezclado con otros productos en el depósito o en el dosificador.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA SU USO: No se han descrito.

TIEMPO DE ESPERA: No precisa.

CONDICIONES DE CONSERVACION: Mantener en lugar fresco, seco y protegido de la humedad.

PRESENTACIONES: 250 ml, 1 litro y 5 litros.

Nº autorización fabricante: αESP25101154

Nº registro España: 38770 – CAT

No requiere prescripción veterinaria.