

LARVIVEX COMPLEX PLUS

Actividad adulticida, larvicida y ovicida

*La fuerza
de la sinergia*

*Barre
los insectos
de tu explotación*



s.p.® veterinaria

LARVIVEX COMPLEX PLUS

Actividad adulticida, larvicida y ovicida

LARVIVEX COMPLEX PLUS

Significa una evolución en los insecticidas debido al efecto sinérgico que presentan sus componentes lo que hace que el producto tenga actividad larvicida, ovicida y adulticida.

UN PRODUCTO, UNA APLICACIÓN: eficaz frente a insectos y ácaros adultos, larvas y huevos.

VENTAJAS

- 1**
AMPLIO ESPECTRO DE ACCIÓN
- 2**
ACTÚA SOBRE TODAS LAS FASES
- 3**
EFICAZ EN MATERIALES POROSOS
COMO NO POROSOS
- 4**
AHORRO DE TIEMPO Y FACILIDAD
DE MANEJO CON UN SOLO PRODUCTO
- 5**
EFICACIA TESTADA
A BAJAS CONCENTRACIONES
- 6**
EFECTO RESIDUAL DE 4 A 6 SEMANAS
- 7**
SEGURO PARA LOS ANIMALES
Y MANIPULADORES

Composición

Cipermetrina	15%
Diflubenzurón.....	9%

Indicaciones

Insecticida-acaricida, con actividad adulticida, larvicida y ovicida de uso ambiental general y ganadero para la lucha y el control de insectos rastreros, voladores, garrapatas, ácaros y pulgas.

Eficacia comprobada frente a:

Moscas (*Musca domestica*, *Stomoxys calcitrans*), mosquitos (*Aedes aegypti*, *Culex pipiens*), avispas (*Vespula germanica*), cucarachas y escarabajos (*Alphitobius diaperinus*, *German cockroach*, *Oriental cockroach*, *Blatta orientalis*, *Cimex lectularius*), hormigas (*Lasius niger*), pulgas (*Ctenocephalides felis*), garrapatas (*Ixodes ricinus*), ácaros (*Dermanyssus gallinae*), entre otros.

Modo de administración y dosificación

Dosis de choque: 5-10 ml por litro de agua (0,5%-1%)

Dosis de mantenimiento: 2,5 ml por litro de agua (0,25%)

Aplicar **1 litro de solución por cada 20 m²** mediante rociado o aspersión. La actividad del producto presenta un **efecto residual o persistencia** de 4 a 6 semanas según el grado de infestación y condiciones meteorológicas.

Recomendaciones de un buen uso de insecticidas

Se recomienda aplicarlo al anochecer, a última hora de la tarde o primera hora de la mañana, en el momento en el que sea menos caluroso, con el fin de mantener el **efecto residual o de persistencia**. Aplicar sobre las superficies donde los insectos habitualmente se posan y habitan, poniendo especial atención en lugares de cúmulos de materia orgánica, anidamiento y puesta de huevos.

La limpieza y eliminación previa de la suciedad y la materia orgánica ayudará a que el producto entre en un contacto más estrecho con las superficies.

Presentaciones

Envase de 250 ml
Envase de 1 litro

 **s.p.® veterinaria, s.a.**

Ctra. Reus-Vinyols Km. 4.1 • 43330 RIUDOMS (Tarragona) • Tel. +34 977 850 170* • Fax +34 977 850 405 • Ap. Correos, 60
www.spveterinaria.com

La información que contiene este folleto ha estado revisada por nuestro equipo técnico y pretende complementar el consejo del profesional veterinario. Para la información completa contacte con nuestros comerciales de zona o a la sección de productos de nuestra página web www.spveterinaria.com