

Los bolos de magnesio Rumbull se moldean en forma de cilindros metálicos de magnesio, aluminio y cobre en una aleación (86, 12 y 2% respectivamente) fusionados con perdigones de hierro. Los bolos están destinados a bóvidos adultos.

Tamaño

(2,5 cms de diámetro por 7,6 cms de longitud) con 40 g de magnesio cada uno.

(1,9 cms de diámetro por 4.6 cms de longitud) con 15g de magnesio cada uno destinados para el ganado ovino adulto o terneros.

Usos

Los bolos Rumbull magnesio son destinados a ser utilizados como una ayuda para la prevención de Tetania hipo-magnésica en vacas lecheras (de al menos 300 kg de peso corporal) y ovejas (de al menos

30 kg de peso corporal) durante el período de alto riesgo asociados con el pastoreo de rápido crecimiento

Hierba de la primavera. También pueden ser utilizados para los terneros lactantes donde la dieta es predominantemente leche.

Como uso colateral se ha observado que a dosis de 2 bolos por vaca adulta 500 kg acelera el secado de verrugas y papilomas facilitando su caída.

Dosificación:

En ganado lechero con al menos 300 kg de peso corporal: Dos bolos de Rumbull a cada animal dos / tres días antes del periodo de riesgo, por ejemplo, antes de la transferencia desde el interior al césped en la primavera. Repetir la dosis después de cuatro semanas.

Ovejas con al menos 30 kg de peso corporal: Un bolo de Rumbull ovejas se debe dar a cada animal dos días antes de la época de riesgo, por ejemplo, después de parir o transferencia a nuevos pastos. Si es necesario, repetir la dosis después de tres semanas.

Terneros con al menos 50 kg de peso corporal: Dos bolos de Rumbull becerros por animal, repetir el tratamiento a las tres semanas si continúan con dieta de leche.

Contraindicaciones, advertencias, etc.

Los bolos de magnesio Rumbull pueden ocasionalmente ser regurgitados. Esto puede suceder al poco de ser administrada si no han sido tragados por completo. El bolo puede alcanzar más fácilmente el retículo o base del rumen si da inmediatamente después heno o ensilado de verde. Los animales deben ser observados cuidadosamente durante unos minutos después de su administración.

Si se da cuenta que el animal ha regurgitado el bolo, el tratamiento debe repetirse.

La carne y la leche tiempo de espera: Cero

